

کلوزاپین

نام ژنریک: کلوزاپین

شکل دارویی: قرص و قرص خفأ دار.

مطالعه و درک اطلاعات دلیل برای بیماران شما بسیار سودمند می‌باشد. اگر به نکته‌ای نامفهوم برخورد کردید یا به اطلاعات بیشتری نیاز دارید در روز نایز دربارۀ ما در روزهای بعد مشورت کنید. قبل از استفاده از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شود. این دارو برای بیماری‌های فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه‌ای به دیگران خودداری کنید. در تصمیم‌گیری برای مصرف یک دارو باید خطرات آن در مقابل فواید حاصل از مصرف دارو سنجیده شود. در مورد کلوزاپین موارد دلیل باید در نظر گرفته شوند:

موارد منع مصرف:

در صورتیکه سابقه هر گونه واکنش غیرعادی یا آلرژیکی به داروی کلوزاپین دارید و همچنین در صورت داشتن حساسیت به هر ماده دیگری مانند غلظا، مواد نگهدارنده یا رنگها، به پزشک خود اطلاع دهید. موارد منع مصرف این دارو شامل موارد ذیل می‌باشند: • واکنش افزایش حساسیت به کلوزاپین یا سایر ترکیبات جانبی موجود در دارو • ناتوانی در انجام آزمایش خون به صورت منظم • افت گلبول سفید خون به خصوص به دلیل مصرف دارو (البته در مورد داروهای شیمی درمانی سدی نمی‌کند) • سابقه قطع مصرف کلوزاپین به دلیل عوارض جانبی جدی مانند آنکراونوسیتوز یا مشکلات قلبی • درمان با داروهای اتی‌سایکوتیک تزریقی طولانی‌اثر • بیماری‌های مغز استخوان و یا سابقه آن • متشنج یا صرع کنترل نشده • بیماری‌های حاد عروقی و رولن که در اثر آسوز، مصرف الکول و مواد و یا وجود اید • کاهش هوشیاری و خواب آلودگی شدید • هر گونه مشکل گردش خون که در ممکن است در نتیجه شوک شدید روی دهد • بیماری‌های شدید قلبی • میوکاردیت (یک نوع التهاب در عضله قلب) • بیماری قلبی شدید هر گونه علائم بیماری‌های فعال کبدی مانند زردی (زرد شدن رنگ پوست و نیز سفیدی چشم، تهوع و بی اشتهاپی) • بیماری‌های کبدی شدید • زردی (روده دراز کست نامی کند و بیوست شدید ایجاد می‌گردد) • هر دارویی که باعث مهار عملکرد استخوان می‌گردد و یا سطح گلبول های سفید خون را کاهش دهد

احتیاطی:

اگر باردار هستید و یا قصد باردار شدن دارید، قبل از مصرف دارو حتما با پزشک خود مشورت کنید زیرا پزشکتان با توجه به منافع و مضرات دارو تصمیم می‌گیرد که دارو را مصرف کنید.

تجویزدهی:

این دارو در شیر مادر ترشح می‌گردد لذا از مصرف آن در دوره شیردهی خودداری کنید و مادرانی که تحت درمان با کلوزاپین می‌باشند، نایبستی به فرزند خود ندهند.

اطفال:

کلوزاپین در افراد زیر شانزده سال نباید مصرف شود زیرا اطلاعات کافی در مورد استفاده دارو در این گروه سنی وجود ندارد.

سالمندان:

احتمال بروز عوارض جانبی زیر در افراد مسن کمی بیشتر است: احساس سبکی سر ناشی از تغییر وضعیت، سرگیجه، غش کردن، افزایش شریان قلب، ابتکار در دفع ادرار و بیوست.

مصرف همراه با سایر داروها:

اگر همزمان با این دارو، هر دارویی حتی داروهای بدون نسخه، گیاهی یا مکمل ویتامینی یا غذایی را مصرف می‌کنید یا اخیراً مصرف کرده‌اید، به پزشک یا داروساز اطلاع دهید.

■ خصوصاً از مصرف کلوزاپین همراه داروهای که مغز استخوان را از عملکرد نرمال خود باز می‌دارند ویا تعداد گلبولهای خونی تولید شده توسط بدن را کاهش می‌دهند خودداری کنید. این داروها شامل موارد زیر می‌باشند: ■ کاربامازپ (سدنتنج) • بعضی آنتی بیوتیکها مانند کاربامکزل و سوفلوامیدها مانند کتریتروپوسازول • بعضی ضد درها از دسته تتراسایکلون ها مانند دوفلین بوتازول • نیتسیلامین (چند درمان روماتیسم مفصلی) • داروهای استینوکسیک که در شیمی درمانی استفاده می‌شوند • داروهای ضد جنون (آنتی سایکوتیک) تزریقی طولانی اثر

■ مهم است که پزشک شما از مصرف داروهای زیر نیز اطلاع داشته باشد:

■ داروهای ضدافسردگی مانند لیتیم، سیتالوپرام، فلوکستین، سیتالوپرام، پاروکستین، فلوکستین و سرتالین، ضدافسردگی های سه حلقه ای، مهار کننده های آنزیم مونوآمین اکسیداز • داروهای ضدجنون (آنتی سایکوتیک) • بنزودیازپین‌ها و سایر داروهای مورد استفاده در درمان اضطراب و بی خوابی • داروهای مخدر و یا سایر داروهای که بر روی تنفس اثر می‌گذارند • داروهای ضدصرع مانند فنیتوئین و الوپروات سدیم • داروهای مورد استفاده برای کاهش یا افزایش خون • داروهای ضدسفتقاد مانند وارفارین • آنتی هیستامین‌ها یا داروهای مورد استفاده در سرماخوردگی، آرزوی و یا تب بونجه • داروهای اتسی کولینژریک جهت درمان لرزه، دیاسیم گدازوی که با تهوع ناشی از مسافرت • داروهای ضدبارداری • داروهای قلبی مانند دیگوکسین • داروهای ضداریتمی • داروهای مورد استفاده در رژیم غذه مانند امپروزیل یا سالیپتیدین • بعضی از آنتی‌بیوتیکها مانند اریتروسایمید و ریباتسین • داروهای ضدخواب مانند کتونازول و داروهای ضدسرورس مانند مهار کننده های پروتئاز (جهت درمان بیماری ایدز) • آنتروپین (داروی مورد استفاده در قطع جنمی، قطع جنمی، داروهای ضدافسردگی) • آندرانولین (داروی مورد استفاده در اورژانس‌ها) • داروهای ضدبارداری خوراکی

سایر بیماریها:

حتیو سایر بیماریها و مشکلات پزشکی می‌تواند مصرف کلوزاپین را تحت تأثیر قرار دهد. مطمئن شوید که هر گونه مشکل پزشکی دیگر خود خصوصاً موارد آهده در ذیل در با به پزشک خود اطلاع دهید:

- مشکلات چشمی مانند گلوکوم (افزایش فشار داخل کره چشم) • دیابت یا قند خون بالا • مشکلات پرپرستان یا اشتکال در دفع ادرار • مشکلات قلبی • مشکلات کبدی یا کلیوی • بیوست مزمن یا مصرف داروهای بیوست اثر • عدم تحمل گالاکتوز
- کمبود آنزیم لکتاز یا عدم جذب گالاکتوز • صرع جنون کنترل شده • بیماری‌های روده بزرگ • سابقه جراحی شکم
- سابقه ضعیفی یا خانوادگی مشکلات سیستم همدانی قلب • مشکلات چشمی ناشی از اختلال در بینایی • افزایش احتمال سکته مغزی یا توجه به عوامل مساعد کننده‌ای مانند افتادن خون بالا، مشکلات قلبی و عروقی و یا مشکلات عروقی سیستم اعصاب مرکزی

روش مصرف مناسب این دارو:

• دارو را دقیقاً طبق دستور پزشکتان مصرف فرمایید و در صورت هر گونه شبهه یا پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. • این دارو را با یک لیوان آب میل نمایید. • از مصرف الکول در دوره درمان خودداری نمایید. • این دارو را می‌توانید همراه با غذا و یا با معده خالی مصرف کنید. • مقدار و طول دوره درمان را پزشک با توجه به نوع اختلال و روند درمان تعیین می‌کند. • بدون دستور پزشک از قطع مصرف و یا تغییر دوز خودداری کنید. • به طول معمول قطع مصرف دارو با دستور پزشک و توجه به تدریج انجام می‌گیرد. • مصرف این دارو نیاز به پایش منظم سطح گلبول های سفید خون توسط پزشک دارد.

دوز فراموش شده:

اگر مصرف یک دوز از دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن، آنرا مصرف فرمایید. با اینحال اگر نزدیک زمان دوز بعدی یا دوز آوردید، از مصرف دوز فراموش شده منصرف شوید و به رژیم معمول قلبی برگردید. هرگز دوز دارو را به جهت جبران دوز فراموش شده دو برابر نکنید.

مصرف بیش از حد:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً با پزشک خود مشورت کنید و یا به مراکز درمانی مراجعه نمایید. مصرف بیش از حد دارو ممکن است منجر به عوارضی مانند خواب آلودگی، خستگی، ضعف، گیجی، کاهش هوشیاری، اغما، تهوع، بی قراری، مشکلات تکلمی، سفتی عضلات، لرزش، تشنج، افزایش بزاق دهان، گشادی مردمک چشم، تازی دند الفست قشار خون، غش کردن، بی نظمی یا افزایش ضربان قلب و اشتکال در تنفس گردد.

هشدارها و احتیاطها:

■ اگر ضمن درمان با کلوزاپین دچار مشکلات زیر شدید، حتماً قبل از مصرف دوز بعدی با پزشک خود مشورت کنید: • در صورت بروز علائمی مانند سرماخوردگی، تب، علائم شبه آنفلوآنزا، گلودرد و یا سایر عفونت ها، پایش سطح گلبول های سفید خون جهت بررسی فوری توسط پزشک توصیه می‌گردد. • افزایش ناگهانی و سریع دمای بدن و سفتی عضلات که ممکن است منجر به بیوهشی گردد. این علائم ممکن است به دلیل عارضه نادر و جدی به نام سندروم توروپولیتیک بدخیم باشد که نیاز به درمان فوری دارد. • علائمی مانند بی نظمی یا افزایش ضربان قلب، تپش قلبه، مشکلات تنفسی، درد قفسه سینه و یا خستگی غیر قابل توجه که ممکن است نیاز به بررسی وضعیت قلب داشته باشد. • علائمی مانند تهوع، استفراغ و بی اشتهاپی که ممکن است نیاز به بررسی وضعیت کبد داشته باشد. • بیوست، دل درد، حساسیت کشمی، تب، نفخ و یا اسهال خونی نیاز به بررسی توسط پزشک دارد.

■ این دارو ممکن است سبب کاهش گلبول های سفید خون گردد لذا قبل، حین و پس از قطع درمان انجام آزمایش خون به طور منظم برای بررسی پزشک توصیه می‌گردد. پزشکتان به شما دقیقاً می‌گوید که چه آزمایشاتی را چه زمانی و با کجا دهید. در هجده هفته اول درمان آزمایشات باید به صورت هفتگی و پس از آن به صورت یاهایانه انجام گیرد. در صورت کاهش گلبول های سفید خون مصرف دارو را متوقف کنید و چهار هفته سی از اتمام درمان نیز انجام آزمایشات و بررسی مجدد توسط پزشک توصیه می‌گردد.

■ پزشکتان قبل از شروع درمان معاینه فیزیکی انجام می‌دهد و ممکن است برای بررسی وضعیت قلب نوار قلبی درخواست نماید.

■ در صورت داشتن اختلال کبدی حین درمان، انجام آزمایش کبدی به طور منظم توصیه می‌گردد.

■ اگر مبتلا به دیابت هستید و یا این دارو برای شما تجویز شده است، پزشکتان ممکن است قند خون شما را به طور منظم بررسی نماید.

■ این دارو ممکن است سبب افزایش وزن و افزایش چربی خون گردد لذا کنترل وضعیت سلامتی توصیه می‌گردد.

■ اگر مصرف کلوزاپین باعث سبکی سر ، گیجی یا ضعف در شما می‌گردد، هنگام برخاستن از حالت نشسته یا درازکش مراقب باشید زیرا این موارد احتمال سقوط را افزایش می‌دهد.

■ اگر مجبور به جراحی شدید و یا به دلایلی قادر به راه رفتن برای مدت طولانی نیستید یا پزشک خود در مورد مصرف کلوزاپین مشورت کنید زیرا ممکن است در معرض خطر ترومبوز (لخته شدن خون وریدی) باشید.

■ کلوزاپین (به خصوص در شروع درمان) ممکن است سبب خستگی، خواب آلودگی یا تشنج گردد لذا از زمانی که این علائم را دارید از رانندگی و کار با ابزارآلاتی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو در اثر تواتر سفید خداری یک سری اثرات ناخواسته می‌باشد. اگر چه تمام این اثرات ناخواسته در یک فرد بروز نمی‌کند اما در صورت بروز هر مشکلی به پزشک خود مراجعه کنید. عوارض جانبی این دارو با آگاهی از آن و مشورت با پزشک قابل پیش‌بینی و قابل رفع می‌باشد. به خاطر داشته باشید که عوارض داروها همواره کمتر از عوارض عدم مصرف آنها می‌باشد.

■ در صورت بروز عوارض جانبی جدی زیر، قبل از مصرف دوز بعدی دارو سریعاً با پزشک خود مشورت کنید:

- عوارض جانبی یا شیوع بیش از ۱۰ به ۱۰۰ مورد: • بیوست شدید • افزایش ضربان قلب
- عوارض جانبی یا شیوع کمتر از ۱۰ به ۱۰۰۰ مورد: • سردی • تشنج • غش کردن • کاهش هوشیاری ناگهانی • همراه با ضعف عضلات (سنگوب)
- عوارض جانبی یا شیوع کمتر از ۱۰ به ۱۰۰۰ مورد: • افزایش ناگهانی و سریع دمای بدن، درگیری عضلات همراه با کاهش سطح هوشیاری (سندروم توروپولیتیک بدخیم) • در صورت بروز این عوارض سریعاً با پزشک خود مشورت کنید.
- عوارض عارض جانبی که بیشتر گزارش شده است:
- عوارض جانبی یا شیوع بیش از ۱۰ به ۱۰۰۰ خواب‌آلودگی، سرگیجه، افزایش بزاق دهان
- عوارض جانبی یا شیوع کمتر از ۱۰ به ۱۰۰۰ مورد: افزایش ناگهانی و سریع دمای بدن، درگیری عضلات همراه با کاهش سطح هوشیاری (سندروم توروپولیتیک بدخیم) • در صورت بروز این عوارض سریعاً با پزشک خود مشورت کنید.
- عوارض عارض جانبی که بیشتر گزارش شده است:
- عوارض جانبی یا شیوع بیش از ۱۰ به ۱۰۰۰ تشنج • غش کردن • کاهش هوشیاری ناگهانی • همراه با ضعف عضلات (سنگوب)
- عوارض جانبی یا شیوع کمتر از ۱۰ به ۱۰۰۰ مورد: کاهش سطح گلبول سفید خون (آنکراونوسیتوز)، مشکلات تکلمی

نیازی به نگرانی از لیست عوارض ذکر شده در مورد این دارو نیست و اکثریت مردم این دارو را بدون هیچ مشکلی مصرف می‌کنند.

■ پزشک دیگری که در بالا نامیده است ممکن است در برخی از بیماران بروز کند لذا اگر متوجه عوارض جانبی دیگری شدید به پزشک خود اطلاع دهید.

شرایط نگهداری دارو:

در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت و دور از دید و دسترس اطفال نگهداری شود.

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، شماره ۲۹۵ ، کد پستی ۰۵۶۹۸-۱۴۱۱۱

تلفن رسیدگی به شکایات: ۰۲۱۳۸۳۸۹۱۱-۳

ایمیل: Complain@sobhandarou.com