

کروتامیتون

نام ژئریک: کروتامیتون

شکل دارویی: کرم موضعی

مطالعه و درک اطلاعات ذیل برای شما سپیار سودمند می‌باشد. اگر به نکته‌ای ناقص یا خود مشورت کنید، قبیل از استفاده از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شود. این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید. در تصمیم‌گیری برای مصرف یک دارو باید خطوات آن در مقابل فاید حاصل از مصرف دارو سنجیده شود. در مورد کرم موضعی کروتامیتون موارد ذیل باید در نظر گرفته شوند:

موارد منع مصرف:

در صورتی که سایق هر گونه واکنش غیرعادی یا الژیک به داروی کروتامیتون دارید و همچنین در صورت داشتن حساسیت به هر ماده دیگری مانند غذاها، مواد نگهدارنده یا رنگها، به پزشک خود اطلاع دهید. موارد منع مصرف این دارو شامل موارد ذیل می‌باشند: • واکنش افزایش حساسیت به کروتامیتون یا سایر محتویات دارو • درمان‌واژه‌ای اکزوداپیو حاد • از تاس این محصول با نواحی خودداری گردد: گردد: چشم‌ها یا اطراف آن، پوستهای آسیب دیده (مانند بردگی) و ناحیه نوک سینه در مادرانی که در دوره شیردهی به سر می‌برند.

حامگلی:

اطلاعات کافی از اینمی داروی کروتامیتون حین بارداری موجود نمی‌باشد لذا از مصرف آن در این دوره (به خصوص طی سه ماهه اول) بدون دستور پزشک خودداری نمایید.

شیرودهی:

با توجه به عدم اطلاعات کافی در مورد ترشح این دارو در شیر مادر، از مصرف آن بدون پزشک خودداری کنید. از تاس دارو با ناحیه نوک سینه نیز خودداری نمایید.

اطفال:

این دارو برای کودکان قابل استفاده می‌باشد با این حال مصرف آن برای کودکان زیر ۳ سال پاید فقط تحت نظر پزشک انجام گیرد.

صرف همراه با سایر داروها:

تداخل دارویی خاصی برای این دارو گزارش نشده است ولی در مصرف داروهای متعدد (به خصوص داروهای موضعی) جانب احتیاط را رعایت کنید.

روش مصرف مناسب این دارو:

• دارو را دقیقاً طبق دستور پزشکان مصرف نمایید و در صورت هر گونه شیشه با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. • این دارو فقط برای استعمال خارجی می‌باشد.

• از تاس دارو با چشم‌ها، دهان، لب‌ها، بینی و سطوح مخاطی خودداری نمایید. • از تاس دارو با ناخن آسیب دیده و بردگی ها خودداری نمایید. • جهت درمان عالمی خارش طبق دستور پزشک مصرف نمایید. • استحمام و خشک کردن پوست قبل از مصرف موضعی دارو در گال توصیه شده است. • برای درمان گال تمامی نواحی بدن از جانه به یابین (به استثنای صورت و پوست سر) با کرم موضعی کروتامیتون آغشته شه گردد. • در بیماری گال توجه به مناطق حساستری مانند مچ دست، لای اঙگستان، ناحیه زیر بغل و تناسلی اهمیت ویژه ای دارد. • برای جلوگیری از الودگی مجدد به

شرایط نگهداری:

در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت و دور از دید و دسترس اطفال نگهداری شود.

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، شماره ۲۹۵ ، کد پستی ۱۴۱۱۸-۵۳۶۹۵

تلفن رسیدگی به شکایات: (۰۱۳) ۳۱۸۳۶۱۹

ایمیل: Complaints@sobhandarou.com