

دی پیریدامول

نام ژئریک: دی پیریدامول

شکل دارویی: قرص روکش دار

- ضعف عضلانی (میاستنی گراویس) • میگرن (این دارو ممکن است سبب تشدید میگرن گردد) • بیماریهای عروق کرونری قلب (شدید) • مشکلات انسدادی جریان خون از بطن چپ • عدم تحمل لاکتوز (نوعی قند)

روش مصرف مناسب این دارو:

- دارو را دقیقاً طبق دستور پزشکان مصرف نمایید و در صورت هر گونه شبهه با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
- دارو را در فواصل یکسان و مشخص خود مصرف کنید.
- این دارو را قل از غذا یا گل لوبان آب میل نمایید.

دوز فراموش شده:

- اگر مصرف یک دوز از دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن، آنرا مصرف نمایید. با اینحال اگر نزدیک زمان دوز بعدی به یاد آورید، از مصرف دوز فراموش شده منصرف شده و به رژیم منظم قبلی برگردید. هرگز دوز دارو را به جهت جریان دوز فراموش شده دو برابر نکنید.

صرف بیش از حد:

- در صورت صرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید. مصرف بیش از حد دارو می‌تواند متخر به عوارضی مانند سردگد، سوء‌هامضه، افت فشار خون و درد قفسه سینه در بیماران قلبی گردد.

هشدارها و اختیارات:

- این دارو حاوی لاکتوز می‌باشد، لذا اگر سایقه عدم تحمل لاکتوز دارید، قبل از صرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

- در صورت بروز واکنش افزایش حساسیت (مانند سایر داروها)، مصرف دارو را قطع کنید و به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

- مصرف این دارو ممکن است سبب سرگیجه گردد. در صورت بروز این علامت از راندنگی و کار با ابزارآلاتی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.

- در صورتیکه تنگی در چه قلب، نارسایی قلبی و یا افت فشار خون دارید، پایش منظم وضعیت قلب توصیه می‌گردد.

عوارض جانبی:

- هر دارو در کنار اثرات مفید خود دارای یک سری اثرات ناخواسته می‌باشد. اگر چه تمام این اثرات ناخواسته در یک فرد بروز نمی‌کند اما در صورت بروز هر مشکلی به پزشک خود مراجعه کنید. عوارض جانبی این دارو با آگاهی از آن و مشورت با پزشک قابل پیش‌بینی و قابل رفع می‌باشد. به خاطر داشته باشید که عوارض داروها به مرتب کمتر از عوارض عدم مصرف آنها می‌باشد.

- عوارض جانبی با شیوع کمتر از یک به ده مورد: سردده، تهوع، اسهال کاهش فشار خون و گرگرگنگی

- عوارض جانبی با شیوع کمتر از یک به صد مورد: راش، استفراغ، درد قفسه سینه و ضربان قلب غیر طبیعی

- بنیازی به نگرانی از لیست عوارض ذکر شده در مورد این دارو نیست و اکثريت مردم این دارو را بدون هیچ مشکلی مصرف می‌کنند.

- عوارض دیگری که در بالا نیامده است ممکن است در برخی از بیماران بروز کنند لذا اگر متوجه عوارض جانبی دیگری شدید به پزشک خود اطلاع دهید.

شوابیت نگهداری:

- در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت و دور از دید و دسترس اطفال نگهداری شود.

دفتر مرکوز:

تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، شماره ۲۹۵ ، کد پستی ۱۴۱۱۸-۵۳۶۹۵

تلفن رسیدگی به شکایات: (۰۱۳) ۳۱۸۸۳۶۱۹

ایمیل: Complaints@sobhandarou.com

مطالعه و درک اطلاعات ذیل برای شما سپیار سودمند می‌باشد. اگر به نکته‌ای نامفهوم بخوبد کردید یا به اطلاعات بیشتری در مورد این دارو نیاز دارید با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. قبل از استفاده از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شود. این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه ای به دیگران خودداری کنید. در تصمیم‌گیری برای مصرف یک دارو باید خطوات آن در مقابل قواید حاصل از مصرف دارو مستجده شود. در مورد دی پیریدامول موارد ذیل باید در نظر گرفته شوند:

موارد منع مصرف:

در صورتیکه سابقه هر گونه واکنش غیرعادی با الژیک به داروی دی پیریدامول دارید و همچنین در صورت داشتن حساسیت به هر ماده دیگری مانند غذاها، مواد تغییردهنده را رنگها، به پزشک خود اطلاع دهید. علاوه و اکتشاف افزایش حساسیت شامل اشکال در تنفس؛ تورم یا تاول پوستی ناحیه چشمها، لبها، دستها، پاها یا گلو؛ بیوتات پوستی شدید همراه با خارش می‌باشد. در صورت بروز چنین واکنش‌هایی (مانند سایر داروها) مصرف دارو را قطع کنید و به پزشک یا واکنش‌های نمایید.

حاملگی:

در صورت بارداری یا قصد باردار شدن، قبل از مصرف دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

شیردهی:

این دارو در شیر مادر ترشح می‌گردد، لذا در صورتیکه در دوره شیردهی به سر می‌برید، قبل از مصرف دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

اطفال:

این دارو برای سینین زیر ۱۲ سال توصیه نشده است.

سامندهان:

صرف خوارکی دی پیریدامول در سالمندان ممکن است سبب افت فشار خون و ضعیتی گردد.

صرف همراه با سایر داروهای:

اگر همざمان با این دارو، هر دارویی حتی داروهای بدون نسخه، گیاهی یا مکمل و بتامینی یا غذایی را مصرف می‌کنید یا اخیراً مصرف کرده اید، به پزشک یا داروساز اطلاع دهید. مخصوصاً ممهم است که پزشک شما از مصرف داروهای زیر اطلاع داشته باشد زیرا ممکن است نیاز به تنظیم مجدد دوز مصرفی دارو باشد:

• اسپرین یا کلوفیدوجرول (داروهای رقیق کننده خون) • خاندانعقادها مانند وارفارین

(جهت توقف لخته) • داروهای سوهاضمه • آذونزین چهت نامنظمی ضربان قلب

• فلودابین جهت لوسی • مهار کننده‌های کولین استراز (برای ضعف عضلانی)

• دیگوکسین • داروهای کاهنده فشار خون

سایر بیماریها:

ضسور سایر بیماریها و مشکلات پزشکی می‌تواند مصرف دی پیریدامول را تحت تأثیر قرار دهد. مطمئن شوید که هر گونه مشکل پزشکی دیگر خود مخصوصاً موارد

امده در ذیل را به پزشک خود اطلاع دهید:

• مشکلات گردش خون و یا دریچه ای قلب مانند تنگی دریچه اثورت در قلب

• آذینی صدری (به خصوص بدتر شدن علاطم آن و یا وجود سایر مشکلات قلبی)

• سابقه حمله قلبی • مشکلات اعقدای خون • فشار خون پایین • نارسایی قلبی