

گاباکس

نام ژنریک: گاباپنتین

شکل دارویی: کپسول

مقاله و درک اطلاعات دلیل برای شما بسیار سودمند می‌باشد. اگر به نکته‌ای نامفهوم برخورد کردید یا به اطلاعات بیشتری در مورد این دارو نیاز دارید یا پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. قبل از استفاده از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شود. این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید. در تصمیم‌گیری برای مصرف یک دارو باید خطرات آن در مقابل فواید حاصل از مصرف دارو سنجیده شود. در مورد گاباکس موارد ذیل باید در نظر گرفته شوند:

موارد منع مصرف:

در صورتی که سابقه هر گونه واکنش غیرعادی یا آلرژیک به داروی گاباپنتین دارید و همچنین در صورت داشتن حساسیت به هر ماده دیگری مانند غذاها، مواد نگهدارنده یا رنگها، به پزشک خود اطلاع دهید. موارد منع مصرف دارو شامل واکنش افزایش حساسیت به گاباپنتین یا سایر محتویات موجود در دارو می‌باشد.

حاملگی:

اگر باردار هستید و یا قصد باردار شدن دارید، قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت کنید. از مصرف دارو بدون دستور پزشک خودداری و در صورت بارداری ضمن درمان نیز سریم با پزشک خود مشورت کنید. معاملات اختصاصی در مورد این دارو در دوران بارداری موجود نیست لذا با توجه به اینکه مصرف داروهای ضد صرع ممکن است اثر سو بر جنین داشته باشد (به خصوص هنگام مصرف همزمان چند داروی ضد صرع)، با دستور و تحت نظر پزشک به جای مصرف داروهای متعدد یک دارو را جایگزین نمایید. هرگز مصرف داروهای ضد صرع را به طور ناگهانی طی بارداری قطع نکنید زیرا ممکن است عواقب جدی برای مادر و یا جنین داشته باشد.

شیردهی:

گاباپنتین در شیر مادر ترشح می‌شود و با توجه به اینکه اثر آن بر شیرخوار نامشخص است، توصیه می‌شود جنین در زمان از تغذیه کودک با شیر مادر خودداری نماید.

اطفال:

به دلیل عدم انجام مطالعات کافی این دارو برای سن زیر ۳ سال توصیه نشده است. مقدار مصرف دارو بایستی دقیقاً طبق دستور پزشک باشد.

مصرف همراه با سایر داروها:

اگر همزمان با این دارو، هر دارویی حتی داروهای بدون نسخه، گیاهی یا مکمل ویتامینی یا غذایی را مصرف می‌کنید یا اخیراً مصرف کرده اید، به پزشک یا داروساز اطلاع دهید. مخصوصاً مهم است که پزشک شما از مصرف داروهای زیر اطلاع داشته باشد:

- مصرف سایر داروهای ضد صرع، ضد افسردگی، ضد اضطراب یا آرام بخش ها
- مصرف داروهای اپیویدی (شبه مورفین) ممکن است سبب افزایش اثر گاباپنتین شود.
- مصرف همزمان با آنتی‌اسیدهای حاوی آلومینوم و منیزیم جذب گاباپنتین از معده را کاهش می‌دهد.
- به دلیل تداخل با آزمایشات آنالیز ادراری (deep stick test) قبل از انجام آزمایش پزشک یا بیمارستان را در جریان قرار دهید.

سایر بیماریها:

حتی‌سایر بیماریها و مشکلات پزشکی می‌تواند مصرف گاباپنتین را تحت تأثیر قرار دهد. مطمئن شوید که هر گونه مشکل پزشکی دیگر خود مخصوصاً موارد آرده در ذیل را به پزشک خود اطلاع دهید:

- مشکلات کلیوی: ممکن است پزشکتان با توجه به شرایط بیماری دوز دارو را تنظیم نماید.
- همودالیز (به دلیل نارسایی کلیه): قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت کنید.
- در صورت بروز و یا تشدید درد یا ضعف عضلانی با پزشک خود مشورت کنید.
- در صورت بروز علائمی مانند درد ناحیه فوقانی شکم (مده)، تهوع و استفراغ سریم با پزشک خود مشورت کنید زیرا ممکن است علائمی از پانکراتیت حاد باشد.
- در صورتی که سابقه هر گونه وابستگی به دارو و یا مواد مخدر دارید، قبل از مصرف دارو به پزشک خود اطلاع دهید.

روش مصرف مناسب این دارو:

همیشه دارو را طبق دستور پزشک مصرف کنید و در صورت عدم اطمینان از روش مصرف یا پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید زیرا پزشکتان با توجه به وضعیت بیماری دوز دارو را تعیین می‌کند. اگر اثر دارو بیش از اندازه و یا کمتر از مقدار مطلوب باشد یا پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. دوز مصرفی در سالمندان مانند سایر افراد می‌باشد مگر اینکه پزشکتان با توجه به مشکل کلیوی دوز دارو شما را تغییر دهد. هرگز بدون نظر پزشک مصرف دارو را قطع ننمایید. ممکن است پزشکتان این دارو را با دوز پایین

شروع نماید و به تدریج افزایش دهد تا به دوز مطلوب برسد. این دارو برای مصرف خوراکی می‌باشد و با یک لیوان آب میل نماید. این دارو را می‌توانید همراه با غذا و یا با معده خالی میل نمایید.

دوز فراموشی شده:

اگر مصرف یک دوز از دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن، آنرا مصرف نمایید. یا اینحال اگر نزدیک زمان دوز بعدی به یاد آوردید، از مصرف دوز فراموش شده منصرف شده و به رژیم منظم قبلی برگردید. هرگز دوز دارو را به جهت جبران دوز فراموش شده دو برابر نکنید.

مصرف بیش از حد:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده، ممکن است عوارض ناخواسته‌ای مانند کاهش هوشیاری، سرگیجه، دوبینی، تکلم نامفهوم، خواب‌آلودگی و اسهال بروز نمایند. لذا در اینگونه موارد سریم با پزشک خود مشورت کنید و یا به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه نمایید. در صورت مراجعه کلیه داروهای مصرفی را همراه خود ببرد تا به بهترین نحو تصمیم‌گیری شود.

هشدارها و احتیاطات:

- هرگز بدون دستور پزشک دارو را قطع نکنید زیرا ممکن است سبب افزایش احتمال بروز حمله عصبی (تشنج) شود. اگر توصیه شده که در ویتهان را قطع کنید بهتر است این کار را به تدریج طی یک هفته انجام دهید و در صورت هر گونه سوال با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
- در صورت بروز واکنش‌های پوستی شدید مانند تورم لبها و صورت، راش، قرمزی پوست و یا ریزش مو نیاز به بررسی سریع می‌باشد.
- در صورت بروز واکنش افزایش حساسیت، مصرف دارو را سریم قطع نموده و به پزشک یا نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه نمایید. علائم این واکنش جدی شامل موارد زیر می‌باشد: راش پوستی، کپسیر، تب، تورم غده‌ای که از بین نمی‌رود، تورم لبها و زبان، زردی پوست و سفیدی چشم، کبودی یا خونریزی غیر معمول، خستگی و ضعف شدید، درد عضلانی غیر قابل انتظار و عفونتهای مکرر.
- در صورت بروز وسوسه‌های فکری خطرناک یا پزشک خود مشورت کنید (با سایر داروهای ضد صرع نیز ممکن است بروز کند).
- آثار ناخواسته‌ای مانند سرگیجه، خواب‌آلودگی و خستگی در بعضی از افراد، می‌تواند بر توانایی فیر در رانندگی و کار یا ابزارالات اثر بگذارد.

عوارض جانبی:

هر دارو در کنار اثرات مفید خود دارای یک سری اثرات ناخواسته می‌باشد. اگر چه تمام این اثرات ناخواسته در یک فرد بروز نمی‌کند اما در صورت بروز هر مشکلی به پزشک خود مراجعه کنید. عوارض جانبی این دارو با آگاهی از آن و مشورت با پزشک قابل پیش‌بینی و قابل رفع می‌باشد. به خاطر داشته باشید که عوارض داروها به‌مراتب کمتر از عوارض عدم مصرف آنها می‌باشد.

- عوارض جانبی شایع تر (بیشتر از ۱ به ۱۰): عفونت ویروسی، خواب‌آلودگی، گیجی، عدم تعادل، احساس خستگی و تب
- عوارض جانبی با شیوع کمتر (بیشتر از ۱ به ۱۰۰ و کمتر از ۱ به ۱۰): عفونت دستگاه تنفسی، کلیوی و گوش؛ کاهش تعداد گلبول سفید؛ افزایش یا کاهش اشتها؛ پرخاشگری، گیجی، تغییرات خلق، افسردگی، عصبانیت و اشکال در تفکر؛ تشنج، حرکات نامنظم، اشکال در تکلم، از دست دادن حافظه، لرزش، مشکلات خواب، سردرد، پوست حساس، کرختی، اشکال در تطابق، حرکات غیرعادی چشم و افزایش، کاهش و یا عدم وجود بازتابی (رفلکسها)؛ تاری دید و دوبینی؛ سرگیجه (Vertigo)؛ افزایش فشار خون، گرگرفتگی و گشادی عروق؛ مشکلات تنفسی، برویشیت، گلودرد، سرفه و آبریزش بینی؛ تهوع، استفراغ، مشکلات دندان، لرزش متهلب، اسهال، درد شکمی، سهاضمه، بیوست، خشکی دهان یا گلو و تفت؛ تورم صورت، کبودی، خارش و راش؛ درد عضلی، عضلانی و بیست و پرش عضلانی؛ ناتوانی جنسی در آقایان؛ تورم دستها و پاها، مشکلات راه رفتن، ضعف، درد، احساس ناخوشی و علائم شبه آنفلوآنزا؛ افزایش وزن؛ آسیب‌های اتضافی، شکستگی و یا ساییدگی
- نیاز به نگرانی از لیست عوارض ذکر شده در مورد این دارو نیست و اکثریت مردم این دارو را بدون هیچ مشکلی مصرف می‌کنند.
- عوارض دیگری که در بالا نیامده است ممکن است در برخی از بیماران بروز کند لذا اگر متوجه عوارض جانبی دیگری شدید به پزشک خود اطلاع دهید.

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت و دور از دید و دسترس اطفال نگهداری شود.

دقت مرکزی:

تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، شماره ۲۹۵، کد پستی ۰۲۶۹۵-۱۴۱۱۸
تلفن رسیدگی به شکایات: ۰۲۱ ۳۱۸۸۳۶۱۹ (۱۳)

ایمیل: Complaints@sobhandarou.com