

## وارنکس

نام ژنریک: وارنیکلین

شکل دارویی: قرص روکش دار خط دار

مطالعه و درک اطلاعات ذیل برای شما بسیار سودمند می‌باشد. اگر به نکته‌های نامفهوم برخورد کردید یا به اطلاعات بیشتری در مورد این دارو نیاز دارید با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. قبل از استفاده از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شود. این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید. در تصمیم‌گیری برای مصرف یک دارو باید خطرات آن در مقابل فواید حاصل از مصرف دارو سنجیده شود. در وارنکس موارد ذیل باید در نظر گرفته شوند:

### موارد منع مصرف:

در صورتیکه سابقه هر گونه واکنش غیرعادی یا آلرژیک به داروی وارنیکلین دارید و همچنین در صورت داشتن حساسیت به هر ماده دیگری مانند غذاها، مواد نگهدارنده یا رنگها، به پزشک خود اطلاع دهید. موارد منع مصرف این دارو شامل موارد ذیل می‌باشند:

• واکنش افزایش حساسیت به وارنیکلین یا سایر محتویات دارو

### حاملیگی:

در صورت بارداری و یا قصد باردار شدن قبل از مصرف دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. زیرا مصرف این دارو طی بارداری با توجه به منافع و مضرات احتمالی آن تعیین می‌گردد.

### شیردهی:

مطالعات کافی در مورد ترشح دارو در شیر مادر و اثرات آن بر شیرخوار موجود نمی‌باشد، لذا اگر به کودک خود شیر می‌دهید، قبل از مصرف دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

### اطفال:

این دارو برای سنین زیر ۱۸ سال توصیه نشده است زیرا اثربخشی آن در این دوره به اثبات نرسیده است.

### مصرف همراه با سایر داروها:

اگر همزمان با این دارو، هر دارویی حتی داروهای بدون نسخه، گیاهی یا مکمل ویتامینی یا غذایی را مصرف می‌کنید یا اخیراً مصرف کرده‌اید، به پزشک یا داروساز اطلاع دهید. مخصوصاً مهم است که پزشک شما از مصرف داروهای زیر اطلاع داشته باشد زیرا ممکن است نیاز به تنظیم مجدد دوز مصرفی دارو باشد:

• ترک سیگار (همراه با بدون مصرف یا وارنیکلین) ممکن است سبب تغییراتی در بدن فرد گردد و با توجه به اثر احتمالی آن بر عملکرد سایر داروهای مصرفی، تنظیم دوز مجدد داروهای مانند توفیلین (جهت درمان مشکلات تنفسی)، وارفارین (ضد انعقاد خون) و انسولین (ضد دیابت) توصیه می‌گردد. برای اطلاعات بیشتر با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

• اگر نارسایی کلیوی شدید دارید از مصرف سایمتیدین (داروی مورد استفاده در زخم معده) همزمان با وارنیکلین خودداری نمایید زیرا ممکن است سبب افزایش سطح خونی وارنیکلین (افزایش احتمال بروز عوارض جانبی) گردد.

• مصرف وارنیکلین همراه با سایر داروهای ترک سیگار (مانند پچ های نیکوتینی) مورد بررسی و مطالعه کافی قرار نگرفته است، لذا درمان توأم این داروها توصیه نشده است.

### سایر بیمارها:

حضور سایر بیماریها و مشکلات پزشکی می‌تواند مصرف وارنیکلین را تحت تأثیر قرار دهد. مطمئن شوید که هر گونه مشکل پزشکی دیگر خود مخصوصاً موارد آمده در ذیل را به پزشک خود اطلاع دهید:

• بیماریهای قلبی و عروقی • نارسایی کلیوی • مشکلات اعصاب و روان (سایکوز، افسردگی، مانیا و اختلال دو قطبی) • مشکلات گوارشی • دیابت

### روش مصرف مناسب این دارو:

• همیشه این دارو را طبق دستور پزشکتان مصرف نمایید و در صورت هر گونه شبهه با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

• این دارو را می‌توانید همراه با غذا و یا با معده خالی میل نمایید.

• داشتن انگیزه احتمال موفقیت در ترک سیگار را افزایش می‌دهد..

• لازم است برای کسب اطلاعات بیشتر و بالا بردن میزان موفقیت در درمان با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

• مطالعات نشان می‌دهد مصرف دقیق و به موقع دارو شانس موفقیت را افزایش می‌دهد لذا دوره درمان را کامل نمایند و بدون دستور پزشک مصرف دارو را قطع نکنید.

• با شروع درمان، بایستی زمانی را برای قطع مصرف سیگار مشخص کنید (برای مثال از ابتدای هفته دوم درمان).

• اگر موفق به ترک کامل سیگار در هفته دوم نشدید، زمان دیگری را برای خود مشخص کنید و یا با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

• اگر نارسایی شدید کلیوی دارید، ممکن است پزشکتان دوز کمتری را تجویز نماید.

### دوز فراموشی شده:

اگر مصرف یک دوز از دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن، آنرا مصرف نمایید. با اینحال اگر نزدیک زمان دوز بعدی به یاد آوردید (مثلاً ۳ تا ۴ ساعت)، از مصرف دوز فراموش شده منصرف شوید و به رژیم منظم قبلی برگردید. هرگز دوز دارو را به جهت جبران دوز فراموش شده دو برابر نکنید.

### مصرف بیش از حد:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده بلافاصله با پزشک خود مشورت کنید و یا به مراکز درمانی مراجعه نمایید.

### هشدارها و احتیاطات:

• مواردی از افسردگی، اضطراب و افکار یا اقدام به خودکشی در بیمارانی که این دارو را مصرف می‌کنند گزارش شده است. لذا اگر تغییرات نگران کننده‌ای در رفتار و خلق و خو شما ایجاد شد، مصرف دارو را قطع و برای ارزیابی بیشتر با پزشک خود مشورت کنید.

• احتمال بروز و یا تشدید مشکلات قلبی و عروقی به خصوص در بیماران با سابقه فردی بیشتر است. در صورت بروز و یا تغییر در علائم با پزشک خود مشورت کنید.

• اگر سابقه تشنج یا صرع دارید، قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت کنید.

• در صورت بروز واکنش افزایش حساسیت (مانند سایر داروها)، مصرف دارو را قطع و به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

### عوارض جانبی:

هر دارو در کنار اثرات مفید خود دارای یک سری اثرات ناخواسته می‌باشد. اگر چه تمام این اثرات ناخواسته در یک فرد بروز نمی‌کند اما در صورت بروز هر مشکلی به پزشک خود مراجعه کنید. عوارض جانبی این دارو با آگاهی از آن و مشورت با پزشک قابل پیش‌بینی و قابل رفع می‌باشد. به خاطر داشته باشید که عوارض داروها به مراتب کمتر از عوارض عدم مصرف آنها می‌باشد.

• عوارض جانبی با شیوع بیش از یک تا ده مورد: تهوع، سردرد، خواب‌های غیر طبیعی، بی‌خوابی و گلودرد چرکی

• عوارض جانبی با شیوع کمتر از یک تا ده مورد: تغییر اشتها، یبوست، خشکی دهان، نفخ، دل درد، اسهال، ریفلاکس مری، خستگی، درد قفسه سینه، خارش، راش پوستی خفیف، خواب آلودگی، سرگیجه، بدم به دهان، تنگی نفس، سرفه، آبریزش بینی، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی (مانند برونشیت و سینوزیت)، تغییر سطح آنزیمهای کبدی، درد مفاصل، عضلات و یا کمردرد

نیازی به نگرانی از لیست عوارض ذکر شده در مورد این دارو نیست و اکثریت مردم این دارو را بدون هیچ مشکلی مصرف می‌کنند.

عوارض دیگری که در بالا نیامده است ممکن است در برخی از بیماران بروز کند لذا اگر متوجه عوارض جانبی دیگری شدید به پزشک خود اطلاع دهید.

### شرایط نگهداری:

در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت و دور از دید و دسترس اطفال نگهداری شود.

### دفتر مرکزی:

تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، شماره ۲۹۵، کد پستی ۵۲۶۹۵-۱۴۱۱۸  
تلفن رسیدگی به شکایات: ۳۱۸۸۲۶۹ (۰۱۳)

ایمیل: Complaints@sobhandarou.com