



نام ژنریک: زینک اکساید

شکل دارویی: پماد موضعی

بعدی به باد آوردید، از مصرف دوز فراموش شده منصرف شده به رزیم منظم قبلى برگردید. هرگز به جهت جبران دور دارو را دو برابر نکنید.

صرف بیش از حد:

در صورت مصرف موضعی بیش از مقدار تومیه شده، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. اگر سه‌ها مقدار دازی از این دارو را بعلیهید، به پزشک با مراکز درمانی مراجعه نمایید.

هشدارها و اختیارات:

• از تماس این دارو با چشمها، سطوح مخاطی و یا دهان خودداری نمایید.

• در صورت بروز واکنش حساسیت پوستی، مصرف دارو را قطع نموده و در اسرع وقت با پزشک خود مشورت نمایید.

• از مصرف طولانی مدت این دارو خودداری نمایید و در صورت عدم پهلوودی با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

• این دارو دارای اثرات ضد عفونی کننده خفیفی می‌باشد، لذا از مصرف آن در غفوتهای پوستی بدون دستور پزشک خودداری نمایید.

عارض جانبی:

هر دارو در کنار اثرات مفید خود دارای یک سری اثرات ناخواسته می‌باشد. اگر چه تمام این اثرات ناخواسته در یک فرد بروز نمی‌کند اما در صورت بروز هر مشکلی به پزشک خود مراجعه کنید. عوارض جانبی این دارو با آگاهی از آن و مشورت با پزشک قابل پیش‌بینی و قابل رفع می‌باشد. به خاطر داشته باشید که عوارض داروها به مرتبه کمتر از عوارض عدم مصرف آنها می‌باشد.

و اکتشاهی‌های پوستی موضعی مانند خارش، قرمزی، خشکی پوست و یا کهیر از عوارض جانبی احتمالی این دارو می‌باشد و در صورت قطع مصرف، این عوارض بایستی تا پذید شوند ولی چنانچه ادامه پیدا کردن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. در صورت بروز هر گونه عارضه‌چی خارج از لیست بالا پزشک یا داروساز خود را مطلع سازید. نیازی به نگرانی از لیست عوارض ذکر شده در مورد این دارو نیست و اکثربت مردم این دارو را بدون هیچ مشکل مصرف می‌کنند.

شرایط نگهداری:

دارو در دمای زیر ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری و از بخزدگی محافظت شود. همچنین دور از دید و دسترس اطفال قرار گیرد.

دفتر مرکزی:

تهران-خ دکتر فاطمی غربی شماره ۲۹۵، کد پستی: ۱۴۱۸-۵۳۶۹۵
تلفن رسیدگی به شکایات: ۰۱۳۳۸۸۳۶۹۰
ایمیل: Complaints@sobhendarou.com

مطالعه و درک اطلاعات ذیل برای شما بسیار سودمند می‌باشد. اگر به نکته‌ای نامهفهوم برخورد کردید یا به اطلاعات بیشتری در مورد این دارو نیاز دارید با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. قبل از استفاده از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شود. این دارو دارای اثرات قابض و محافظت کننده پوست می‌باشد، لذا در درمان ضایعات پوستی سطحی مانند عرق سوز، گزش حشرات، ادرار سوتختی، خراشیدگی و سوختگی‌های خفیف استفاده می‌شود. در مورد پماد زینک اکساید موارد ذیل باید در نظر گرفته شوند:

موارد متع مصرف:

در صورتیکه سابقه هر گونه واکنش غیرعادی با آرژیک به پماد زینک اکساید دارید، از مصرف دارو خودداری نمایید و همچنین در صورت داشتن حساسیت به هر ماده دیگری مانند غذاها، مواد نگهدارنده یا رنگها، به پزشک خود اطلاع دهید. این دارو برای درمان غفوتهای قارچی استفاده نمی‌گردد و از مصرف آن در زخها و سوختگی وسیع نیز، خودداری نمایید.

حاملگی:

اگر باردار هستید و یا قصد باردار شدن دارید، قبل از مصرف دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

شیردهی:

اگر در دوره شیردهی به سر می‌برید، قبل از مصرف دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

صرف همراه با سایر داروهای:

اگر هم‌زمان با این دارو هر دارویی حتی داروهای بدون نسخه، گیاهی یا سایر داروهای موضعی یا آرایشی و یهداشتی را مصرف می‌کنید و یا به تازگی مصرف نموده‌اید، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید. لازم به ذکر است بتزیل پنی سیلین با این پماد سازگاری ندارد.

روش مصرف مناسب این دارو:

همیشه این دارو را طبق دستور پزشک خود مصرف نمایید و در صورت هر گونه شبیهه با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. این دارو فقط برای مصرف خارجی (پوستی) می‌باشد و از تماس آن با چشمها، سطوح مخاطی و یا دهان خودداری نمایید. به صورت معقول دوز مصرفی این دارو ۲ تا ۴ بار در روز می‌باشد. قبل از هر بار مصرف ناخیه درگیر را شست و شو داده و پس از خشک کردن مقدار کافی از پماد را بر روی موضع بماليید. از مصرف طولانی مدت دارو خودداری کنید و در صورت عدم بهبودی با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

دور فراموش شده:

اگر مصرف یک دوز از دارو را فراموش کردید، به محفوظ بیاید آوردن، آن را مصرف نمایید، با این حال اگر نزدیک زمان دوز

